



دستورالعمل آمادگی های لازم برای انجام تصویر برداری های پزشکی



تهیه و تنظیم: واحد آموزش بچگانی و ارتقاء سلامت



تنقیه باریوم (Barium enema)

از آزمایش باریوم انما (Barium enema) جهت بررسی روده بزرگ به کمک اشعه ایکس استفاده می شود.

آمادگی های قبل از انجام آزمون:

(۱) بیمار باید حدود ساعت ۴ بعد از ظهر روز قبل از آزمون، یک شیشه ۴۰ گرمی روغن کرچک استفاده کرده؛ حدود ساعت ۶ بعد از ظهر، ۲ عدد قرص دایمتیکون مصرف نموده؛ به عنوان شام، سوپ ساده صاف شده بدون حبوبات و لبنیات میل نموده و پس از شام هم ۲ عدد قرص دایمتیکون مصرف نماید.

(۲) در صورت عدم تخلیه روده حدود ۵ بار در مدت ۴ ساعت، بیمار باید دوباره یک شیشه روغن کرچک دیگر استفاده نماید.

(۳) در صورت حساسیت به روغن کرچک می توان از پودر پیدروولاکس استفاده کرد.

در صورت بارداری و یا شک به آن، حتماً به پزشک یا تکنسین اطلاع دهید.

مسئول فنی واحد رادیولوژی