




## دستورالعمل آمادگی های لازم برای انجام تصویر برداری های پزشکی



تهیه و تنظیم: واحد آموزش بگمانی و ارتقاء سلامت



## پیلوگرام داخل وریدی (IVP)

پیلوگرام داخل وریدی، یک آزمایش تصویر برداری پزشکی است که با استفاده از تزریق مواد حاجب به رگ ها ، سیستم ادراری در عکس برداری اشعه ایکس به وضوح دیده می شود.

### آمادگی های قبل از انجام آزمون:

۱) بیمار باید از یک روز قبل از انجام آزمون، مصرف قرص متفورمین را قطع کرده و تا ۴۸ ساعت پس از انجام آزمون نیز آن را مصرف ننماید.

۲) بیمار باید حدود ساعت ۴ بعد از ظهر روز قبل از آزمون، یک شیشه ۴۰ گرمی روغن کرچک استفاده کرده؛ حدود ساعت ۶ بعد از ظهر، ۲ عدد قرص دایمتیکون مصرف نموده؛ به عنوان شام، سوپ ساده صاف شده بدون حبوبات و لبنیات میل نموده و پس از شام هم ۲ عدد قرص دایمتیکون مصرف نماید.

۳) در صورت عدم تخلیه روده حدود ۵ بار، بیمار باید یک شیشه روغن کرچک دیگر استفاده نماید.

۴) در صورت حساسیت دارویی یا عدم تحمل روغن کرچک می توان از پودر پیدرولاکس استفاده کرد.

۵) مصرف مایعات و چای تا شب قبل از آزمون منعی ندارد ولی مصرف مایعات در روز آزمون ممنوع است.

۶) صبح روز آزمون بیمار باید به صورت ناشتا به رادیولوژی مراجعه نماید.

۷) بیمار باید آزمایشات Cr و BUN را انجام دهد.

در صورت بارداری و یا شک به آن، حتماً به پزشک یا تکنسین اطلاع دهید.

## مسئول فنی واحد رادیولوژی

۱۷۳ -۸ -۰۳۱۳۷۴۸۱۳۹۷ داخلی

[www.shafa-mui-ac-ir](http://www.shafa-mui-ac-ir)